

Dosificación cefepime/enmetazobactam (FEP/META)

Forma de administración: Vía intravenosa (IV)

Posología:

• ITUc

2 g cefepima/0,5 g
enmetazobactam
cada 8h perfusión IV **2h**

• NAH/NAVM

2 g cefepima/0,5 g
enmetazobactam
cada 8h perfusión IV **4h**



Único ajuste
necesario en base a la
función renal

Tabla 1. Dosis recomendada de EXBLIFEP® en pacientes con insuficiencia renal.

TFGe absoluta (mL/min)	Dosis recomendada de EXBLIFEP® (cefepima y enmetazobactam)	Intervalo de dosis
Leve (60-<90)	Cefepima 2 g y enmetazobactam 0,5 g	Cada 8 horas
Moderada (30-<60)	Cefepima 1 g y enmetazobactam 0,25 g	Cada 8 horas
Grave (15-<30)	Cefepima 1 g y enmetazobactam 0,25 g	Cada 12 horas
Insuficiencia renal terminal (<15)	Cefepima 1 g y enmetazobactam 0,25 g	Cada 24 horas
Pacientes en hemodiálisis	Dosis de carga de 1 g de cefepima y 0,25 g de enmetazobactam el primer día de tratamiento y, a partir de entonces, 0,5 g de cefepima y 0,125 g de enmetazobactam (cada 24 horas, pero una vez finalizada la sesión los días de hemodiálisis)	Cada 24 horas
Pacientes sometidos a diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA)	Cefepima 2 g y enmetazobactam 0,5 g	Cada 48 horas

En el caso de pacientes con **NAH**, incluida la **NAVM**, la duración de la perfusión debe ser de **4 horas**, independientemente del grado de la insuficiencia renal.

Posología en poblaciones especiales

Pacientes de edad avanzada



No se requiere ajuste de dosis
en los pacientes de edad
avanzada

Insuficiencia hepática



No se requiere ajuste de dosis
en los pacientes con
insuficiencia hepática

FEP/META: cefepima/enmetazobactam; **ITUc:** infección del tracto urinario complicada; **IV:** intravenosa; **NAH:** neumonía adquirida en el hospital; **NAVM:** neumonía asociada a ventilación mecánica; **TFGe:** tasa de filtración glomerular estimada.

Ficha Técnica EXBLIFEP® 2 g/0,5 g polvo para concentrado para solución para perfusión. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1241794001/FT_1241794001.html. Último acceso: enero 2026.



Acceda a través de este QR a la ficha técnica actualizada de Exblifep

PRESENTACIÓN Y PRECIO: EXBLIFEP 2 g/0,5 g polvo para concentrado para solución para perfusión, 10 viales de 20 ml. CN: 764660.0. PVL notificado: 1.150 €. PVL (IVA): 1.196 €.

CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Medicamento sujeto a prescripción médica y financiado por el Sistema Nacional de Salud. Uso Hospitalario. Sin aportación.

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Este material tiene carácter promocional y está dirigido exclusivamente a profesionales sanitarios y está desarrollado conforme a la normativa aplicable. El acceso o reenvío de esta información a pacientes no está permitida. Usted es responsable del uso de esta información. Si desea informarnos sobre un acontecimiento adverso o reclamación técnica, por favor, diríjase a la dirección medicinalinformation@advanzpharma.com.