

Cefepima/enmetazobactam (FEP/META): La combinación con la actividad más específica frente a BLEEs ± OXA-48 ± AmpC¹

	Enterobacterales					<i>P. aeruginosa</i>		<i>Acinetobacter</i>	
	BLEE	AmpC	KPC	MBL	OXA-48	Susceptible a 3 ^a /4 ^a gen cef	MDR	CRAB	MDR
Cefepima/Enmetazobactam*	Verde	Verde	Rojo	Rojo	Verde	Verde	Rojo	Amarillo	Rojo
Aztreonam/Avibactam	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Amarillo	Amarillo	Rojo	Rojo
Cefiderocol	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Ceftolozane/Tazobactam	Verde	Amarillo	Rojo	Rojo	Rojo	Verde	Verde	Rojo	Rojo
Ceftazidime/Avibactam	Verde	Verde	Verde	Rojo	Verde	Verde	Verde	Rojo	Rojo
Imipenem/Relebactam	Verde	Verde	Verde	Rojo	Rojo	Verde	Verde	Rojo	Rojo
Meropenem/Vaborbactam	Verde	Verde	Verde	Rojo	Rojo	Verde	Rojo	Rojo	Rojo
Eravaciclina	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Rojo	Rojo	Verde	Verde

Verde: actividad antimicrobiana (AA); amarillo: AA parcial; rojo: no AA.

BLEE: β-lactamasas de espectro extendido; **AmpC:** β-lactamasa de tipo AmpC; **KPC:** *Klebsiella pneumoniae* carbapenemasa; **MBL:** metalo-β-lactamasas; **OXA-48:** carbapenemasa de clase D (oxacilinas); **gen cef:** generación de cefalosporinas; **MDR:** multirresistentes; **CRAB:** *A. baumannii* resistente a los carbapenemes.

Adaptación de la Figura 6: Gajic I, Tomic N, Lukovic B, Jovicic M, Kekic D, Petrovic M, et al. A Comprehensive Overview of Antibacterial Agents for Combating Multidrug-Resistant Bacteria: The Current Landscape, Development, Future Opportunities, and Challenges. *Antibiotics* (Basel). 2025;14(3):221.

FEP/META, la primera combinación de cefepima con un inhibidor de β -lactamasa aprobada para *Enterobacterales* multirresistentes (MDR)¹

Cefepima



Actividad bactericida a través de la inhibición de las proteínas de unión a penicilina (PBPs)²

OXA-48²

AmpC^{2*}

Enmetazobactam

Inhibidor β -lactamasas que evita la hidrólisis de cefepima²



BLEE²

FEP/META ha demostrado actividad frente:²

*La adición de **enmetazobactam** contrarresta el efecto inóculo de **cefepima** en *Enterobacter spp.* hiperproductoras de AmpC.³

1. Bhowmick T, Canton R, Pea F, Quevedo J, Santerre Henriksen A, Timsit JF, et al. Cefepime-enmetazobactam: first approved cefepime- β -lactamase inhibitor combination for multi-drug resistant Enterobacterales. Future Microbiol. 2025;20(4):277-286. 2. Ficha Técnica EXBLIFEP® 2 g/0,5 g polvo para concentrado para solución para perfusión. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1241794001/FT_1241794001.html. Último acceso: septiembre 2025. 3. Ciorata-Mihalcea E, Rodríguez-Villodres A, Soto Gallego C, Ortiz JM, Rodríguez-Rodríguez M & Antonio J. Impact of bacterial inoculum on the activity of cefepime and cefepime/enmetazobactam against AmpC-hyperproducing Enterobacter spp. Póster publicado en ESCMID 2025.



Acceda a través de este QR a la ficha técnica actualizada de Exblifep

PRESENTACIÓN Y PRECIO: EXBLIFEP® 2 g/0,5 g polvo para concentrado para solución para perfusión, 10 viales de 20 ml. CN: 764660.0. PVL notificado: 1.150 €. PVL (IVA): 1.196 €
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Medicamento sujeto a prescripción médica y financiado por el Sistema Nacional de Salud. Uso Hospitalario. Sin aportación.

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Este material tiene carácter promocional y está dirigido exclusivamente a profesionales sanitarios y está desarrollado conforme a la normativa aplicable. El acceso o reenvío de esta información a pacientes no está permitida. Usted es responsable del uso de esta información. Si desea informarnos sobre un acontecimiento adverso o reclamación técnica, por favor, dirijase a la dirección medicinalinformation@advanzpharma.com.